

Desinfizierendes Einstreumittel



BASIC

Dokumentierte Qualitätshygiene

Das wissenschaftlich formulierte Pulver ist sicher im Gebrauch und leicht anzuwenden. Basic® verbessert die unmittelbare Umgebung der Tiere, indem es schädliche Pathogene austrocknet und hemmt. Basic® reduziert Feuchtigkeit und potenziell gefährliche Gase wie Ammoniak. Bei regelmäßigem Gebrauch beugt Basic® Krankheiten vor und sichert ein besseres Milieu für gesündere Tiere.

- Super Qualität zum Discountpreis
- Basic® ist wissenschaftlich geprüft
- Hemmt das Schlüpfen von Fliegenlarven
- Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen
- Absorbiert gut – kräftig austrocknend
- Verklumpt nicht auf Lager
- Gute Bindung von Ammoniak
- Geeignet für alle Arten von Tierhaltung und Stallsystemen
- Verbessert das Stallmilieu
- Reduziert den Geruch von Ammoniak
- Erfrischt den Stall

Beschreibung:

Basic® besteht aus verschiedenen besonders ausgewählten Rohmaterialien. Darunter Mineralien, Pflanzenteile und ein desinfizierender Aktivstoff. Basic® wird zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse innerhalb aller Arten von Tierhaltung und allen Stallsystemen verwendet. Basic® kann manuell oder maschinell ausgelegt werden, oder mit anderer Streu vor der Zuteilung vermischt werden.

Verwendung:

Basic® kann für alle Tierarten und alle Stallsysteme zum Austrocknen, senken des Krankheitsdrucks und einem verbesserten Wohlergehen der Tiere verwendet werden.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk



Desinfizierendes Einstreumittel



Gebrauchsanweisung

Basic® - Schafe und Ziegen

Basic® ist die richtige Wahl um ein trockenes Milieu in der Mutterschafbucht der Lämmerbucht, der Tiefstreu usw. zu sichern.

Basic® kann vorteilhaft auf dem Boden im Verhältnis 60-85 g pro m² Bodenfläche verteilt werden, bevor die Einstreu wie z.B. Stroh zugeteilt wird. Basic® wird danach auf der Einstreu in gleicher Menge ausgestreut, kann aber auch mit der Einstreu vor dem Auslegen vermischt werden. Basic® hat eine vorbeugende Wirkung gegen Fliegeneier und Fliegenlarven, da es auf Grund seiner guten Absorptionskapazität sehr austrocknend wirkt.

Basic® sollte die ersten 3 Tage nach dem gründlichen Ausmisten täglich, und danach regelmäßig 2-3 Mal wöchentlich verwendet werden.

Die konsequente Zuteilung von Basic® sichert ein trockenes Milieu, bindet Ammoniak und absorbiert Feuchtigkeit. Bei großem Krankheitsdruck und bei besonders feuchten Verhältnissen im Stall, sollte Basic® täglich mit einer Dosierung von 75-100 g pro m² Fläche verteilt werden. Diese Menge Basic® sollte beibehalten werden, bis die Verhältnisse im Stall sich wieder normalisiert haben.



Dokumentierte Wirkung gegen:

- E-coli
- Salmonella Thyphimorium
- Streptococcus Suis Serovar 7
- Streptococcus Uberis
- Staphylococcus Aureus
- Klebsiella Pneumoniae
- Aspergillus Niger
- Clostridium Perfringens
- Camphylobactor Jejuni
- Dishelobactor Nodosus



www.destek.dk

Destek ApS

Orebovej 29

DK-4293 Dianalund

Tel.: +45 3313 1125

Mail: info@destek.dk

